


MOWA A TRZECI MIGDAŁ



Gdzie jest?

Na tylnej ścianie gardła nad podniebieniem miękkim i migdałkami podniebiennymi.

Do kiedy rośnie?

Rozwija się po narodzinach i rozrasta się do 3.–5. roku życia. Po 7 urodzinach jego rola w układzie odpornościowym maleje i migdał zaczyna zanikać.

Dlaczego migdał czasem staje się przerośnięty?

Po kontakcie z wirusem zwiększa swoją objętość w procesie zdrowienia zmniejsza się samoistnie. W przypadku jednak, gdy często jesteśmy chorzy migdałek jest drażniony w sposób ciągły i nie wraca do normalnych rozmiarów, lecz rozrasta się jeszcze bardziej.

Jakie są objawy?

- nawracające zapalenia ucha środkowego
- nawracające zapalenie ucha środkowego
- zalegająca wydzielina w nosie spowodowana zatkanymi nozdrzami, a co za tym idzie zaburzonym procesem transportu śluzu
- częste bóle gardła spowodowane powietrzem, które dostaje się przez usta, jest nieogrzane i nieoczyszczone
- chrapanie
- zaburzenia snu- bezdech

- powiększone szyjne węzły chłonne

Jakie są częste skutki takiego przerośnięcia?

- Oddychanie przez usta
- Otwarta buzia
- Częste infekcje
- Wady zgryzu
- Zmęczenie, brak koncentracji
- wąskie, wysoko wysklepione podniebienie, tak zwane „gotyckie podniebienie”, któremu towarzyszą wady zgryzu np. zgryz otwarty
- płaska i słaba rozwinięta klatka piersiowa
- zakłócenie mowy
- słabsze wyniki w nauce

Jakie zaburzenia mowy powoduje przerośnięty migdał?

1. **Międzyzębowość**
2. **Mowa bezdźwięczna**
3. **Mowa nosowa**

Co zrobić jeśli zauważyliśmy powyższe objawy?

Należy zgłosić się na konsultacje do laryngologa oraz logopedy



<https://www.hellozdrowie.pl/artykul-nie-usuwaj-migdalkow-chyba-ze-naprawde-musisz/>